

UBS · Dr. Thomas Meineke

Biologische Landeserkundung



Veröffentlichungen

- MEINEKE, T. (1974): Ein atypisch singender Buchfink (*Fringilla coelebs*). Ornithologische Mitteilungen 26: 102.
- MEINEKE, T. (1974): Interspezifische Verhaltensweisen von drei synchron und in einem Baumstamm brütenden Höhlenbrüterarten. Ornithologische Mitteilungen 26: 184.
- BRUNKEN, G. & MEINEKE, T. (1976): 1. Jahresbericht der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Göttingen für das Jahr 1975. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Göttingen. Göttingen. 28 S. (Selbstverlag).
- MEINEKE, T. (1976): Winterfeststellungen des Zilpzalps (*Phylloscopus collybita*) 1974/75 im Raum Westharz-Göttingen (Süd-Niedersachsen). Ornithologische Mitteilungen 28: 19-20.
- MEINEKE, T. (1976): Extremer Neststandort und Brutbiotop des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*). Ornithologische Mitteilungen 28: 69-71.
- MEINEKE, T. (1976): Beobachtungen von Insektenwanderungen auf der Insel Sylt in der Zeit vom 30.VII. - 9.VIII.1975. Atalanta 7: 216-218.
- MEINEKE, T. (1977): Zum Auftreten von *Amathes sexstrigata* nach planmäßigen Lichtfallenfängen am SW-Harz (Lep., Noctuidae). Entomologische Zeitschrift 87: 277-279.
- BERTRAM, W. & MEINEKE, T. (1978): Seidenreihler (*Egretta garzetta*) bei Herzberg. Material zur Avifauna Raum Herzberg Harz 1: 4.
- MEINEKE, T. (1978): Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für den Raum Herzberg am Harz. Faun. Mitt. Süd-Niedersachsen 1: 111-134. [auch in: Material zur Avifauna Raum Herzberg Harz 1: 5-28.]
- MEINEKE, T. (1978): Avifaunistischer Jahresbericht 1977 für den Raum Herzberg am Harz. Faunistische Mitteilungen Süd-Niedersachsen 1:317-343. [auch in: Material zur Avifauna Raum Herzberg Harz 1: 29-56.]
- MEINEKE, T. (1978): BLASIUS MERREM: 'Verzeichniß der rothbluetigen Thiere in den Gegenden um Goettingen und Duisburg, wahrgenommen'. Faunistische Mitteilungen Süd-Niedersachsen 1: 159-172.
- MEINEKE, T. (1979): Kommentierte Artenliste der Großschmetterlinge aus dem Raum Herzberg am Harz. Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 32: 3-14.
- MEINEKE, T. (1979): Beobachtungen zur Brutbiologie des Hänflings (*Carduelis cannabina*) bei Herzberg am Harz. Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 32: 86-93.
- MEINEKE, T. (1979): Massenwanderung von *Epistrophe balteata* DE GEER am südwestlichen Harzrand 1978 (Dipt., Syrphidae). Atalanta 10: 96-99.
- MEINEKE, T. (1979): FR. CHR. GUNTHERS Beschreibung eines 1774 bei Trockenborn (Landkreis Stadtroda) gefundenen Nestes und Geleges vom Fichtenkreuzschnabel. Thüringer Ornithologische Mitteil. 25: 51-53.
- MEINEKE, T. & WESTHEIDE, W. (1979): Gezeitenabhängige Wanderungen der Interstitialfauna in einem Sandstrand der Insel Sylt (Nordsee). Mikrofauna Meeresboden 75: 203-236.





- GARVE, E. & MEINEKE, T. (1980): *Filago arvensis* und andere bemerkenswerte Gefäßpflanzen im südwestlichen Harzvorland. Göttinger Floristische Rundbriefe 14: 67-73.
- MEINEKE, T. (1980): Bockkäfer (Cerambycidae, Coleoptera) aus dem südwestlichen Harz-Rand und seinem Vorland. Beiträge Naturkunde Niedersachsens 33: 23-25.
- MEINEKE, T. (1980): Beitrag zur Großschmetterlingsfauna der Nordseeinsel Helgoland. Entomologische Zeitschrift 90: 105-114.
- MEINEKE, T. (1980): Untersuchungen zum Vorkommen der Grünfrösche (*Rana ridibunda*, *Rana lessonae*, *Rana esculenta*) im Raum Herzberg am Harz und Northeim (Süd-Niedersachsen). Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 33: 44-55 u. 145.
- MEINEKE, T. (1980): Heimzug des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) und des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe*) 1977 bei Herzberg am Harz. Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 33: 140-145.
- GARVE, E. & MEINEKE, T. (1982): Neuer Nachweis der Weißwangengans (*Branta leucopsis*) in Süd-Niedersachsen. Faunistische Mitteilungen Süd-Niedersachsen 4/5: 55-56.
- MEINEKE, T. & GATTER, W. (1982): Der Wegzug des Rotmilan (*Milvus milvus*) im Bereich von Westharz und Randecker Maar/Schwäbische Alb. Seevögel Sonderheft 1982: 39-44.
- BRUNKEN, G. & MEINEKE, T. (1983): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) in Süd-Niedersachsen. Vogelkundliche Berichte Niedersachsen 29: 43-46.
- MEINEKE, T. & Scherner, E. R. (1983): Abnorm gefärbte Handschwinge einer adulten Zwergmöwe (*Larus minutus*). Beiträge zur Vogelkunde 29:43-46.
- BRUNKEN, G. & MEINEKE, T. (1984): Amphibien und Reptilien zwischen Harz und Leine. Forsch. Ber. Naturschutz Landschaftspflege (Schriftenreihe Naturschutz Landschaftspflege, Beiheft) 10: 1-59.
- MEINEKE, T. (1984): Untersuchungen zur Struktur, Dynamik und Phänologie der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) im südlichen Niedersachsen. Mitteilungen zur Fauna und Flora Süd-Niedersachsens 6: 1-453.
- MEINEKE, T. (1985): Zur Struktur der Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) auf Helgoland. Seevögel 6, Sonderband: 36-41.
- MEINEKE, T. (1985): Revision und Zusammenfassung der von KLAUS RETTIG bisher veröffentlichten Schmetterlingsfunde aus Ostfriesland in Niedersachsen (Insecta, Lepidoptera). - In: K. RETTIG (Hrsg.): Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands 24. Bericht. Emden. [Selbstverlag]. S. 1-12.
- MEINEKE, T. (1986): Schmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) zweier südexponierter Kalk-Hangbuchenwälder im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). Mitteilungen zur Fauna und Flora Süd-Niedersachsens 8: 1-14.
- MEINEKE, T. (1986): *Antichloris eriphia* (FABRICIUS, [1776]) (Lepidoptera: Ctenuchidae) nach Göttingen verschleppt. Mitteilungen zur Fauna und Flora Süd-Niedersachsens 8: 15-16.
- MEINEKE, T. (1986): Funde von *Urocerus gigas* (LINNAEUS, 1758), *Trichiosoma sorbi* HARTIG, 1840 und *Tenthredopsis scutellaris* (FABRICIUS, 1804) (Hymenoptera: Symphyta) im südlichen Niedersachsen und in Nordhessen. Mitteilungen Fauna Flora Süd-Niedersachsens 8: 17-18.
- MEINEKE, T. & REUSCH, H. (1986): Köcherfliegenfunde im südlichen Niedersachsen (Insecta, Trichoptera). Mitteilungen Fauna Flora Süd-Niedersachsens 8: 25-30.
- MEINEKE, T. & REZBANYAI-RESER, L. [1987]: *Mesapamea*-Studien VI. Weitere Nachweise von *M. remmi* REZBANYAI-RESER, 1985, aus der Bundesrepublik Deutschland - genitalmorphologische Aberration oder wieder eine neue *Mesapamea*-Art? (Lep. Noctuidae). Entomologische Berichte Luzern 16 (1986): 151-157.
- MEINEKE, T. (1989): Fluktationskurven einiger Schmetterlingsarten (Insecta: Lepidoptera) bewaldeter und offener Lebensräume im südlichen Niedersachsen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 17: 799-804.





- MEINEKE, T. (1991): Buchbesprechung: WULF GATTER -Die Wanderungen der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) am Randecker Maar (Spixiana, Supplement 15, 1990). Entomologische Zeitschrift 101: 171-172.
- MEINEKE, T. [1991]: Phänologie der nächtlichen Flugaktivität des Kleinen Ohrwurms (*Labia minor* L.) im südlichen Niedersachsen (Insecta: Dermaptera). Göttinger naturkundliche Schriften 2 (1990): 59-63.
- MEINEKE, T. [1991]: Kritische Sichtung der Literaturangaben zur Geradflügler-Fauna des Naturraumes Harz (Orthoptera, Dictyoptera, Dermaptera). Göttinger naturkundliche Schriften 2 (1990): 17-39.
- MEINEKE, T. (1991): Der Trespen-Federschwingel (*Vulpia bromoides* (L.) S.F. GRAY) in Niedersachsen wiederentdeckt. Floristische Rundbriefe 24: 6-9.
- MEINEKE, T., Gatter, W. & Gatter, D. (1991): Massenwanderungen von Gemeinen Ohrwürmern (*Forficula auricularia* L.), Marienkäfern (*Coccinella septempunctata* L.) und Wanzen (Pentatomidae, Lygaeidae) in Südspanien. Entomologische Zeitschrift 101: 239-244.
- MEINEKE, T. [1992]: Auswertung von Fraßresten der beiden Langohrarten *Plecotus auritus* L. und *Plecotus austriacus* FISCHER. Naturschutz Landschaftspflege Niedersachsen 26 (1991): 37-45.
- MEINEKE, T. & MENGE, K. (1993): *Tetrix ceperoi* (BOLIVAR, 1887) und andere bemerkenswerte Heuschrecken in Sachsen-Anhalt gefunden (Orthoptera: Tettigoniidae, Tetrigidae, Acrididae). Entomologische Zeitschrift 103: 367-375.
- WALLASCHEK, M., unter Mitarbeit von G. GREIN, T. MEINEKE, J. MÜLLER, P. NEUHÄUSER, J. OHST, R. SCHWEIGERT & R. STEGLICH (1993): Rote Liste der Heuschrecken des Landes Sachsen-Anhalt (1. Fassung, Stand Mai: 1993). – Berichte d. Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt 9: 25-28.
- MEINEKE, T. (1994): Verbreitung brachypterer und makropterer Individuen von *Chorthippus parallelus* (ZETTERSTEDT) im Hochharz (Orthoptera: Acrididae) (2. Vorarbeit zu einer Fauna der Heuschrecken, Schaben und Ohrwürmer des Harzes.) Göttinger naturkundliche Schriften 3: 55-66.
- MEINEKE, T. (1994): Ausbreitungsversuche und initiale Populationsstadien von *Chorthippus parallelus* (ZETTERSTEDT, 1821) im Hochharz. (5. Vorarbeit zu einer Studie über die Fauna der Heuschrecken, Schaben und Ohrwürmer des Harzes). Articulata 9: 33-42.
- MEINEKE, T. [1994]: Nachtfalter in der naturschutzrelevanten Raumplanung: Grundlagen, Methoden, Auswertung. Schriftenreihe f. Landschaftspflege u. Naturschutz 43: 79-106.
- MEINEKE, T., MENGE, K. & GREIN, G. (1994): Der Steppengrashüpfer, *Chorthippus vagans* (EVERSMANN, 1848), (Insecta: Orthoptera) im und am Harz gefunden (3. Vorarbeit zu einer Fauna der Heuschrecken, Schaben und Ohrwürmer des Harzes.). Göttinger naturkund. Schriften 3: 45-53.
- DETZEL, P. & MEINEKE, T. (1998): *Tetrix subulata* (LINNAEUS, 1758) / *Tetrix undulata* (SOWERBY, 1806) / *Tetrix tenuicornis* (SAHLBERG, 1893). – In: DETZEL, P. (Hrsg.): Die Heuschrecken Baden-Württembergs., Stuttgart, S. 332-344.
- DETZEL, P., MEINEKE, T., WANCURA, R. & CORAY, A. (1998): *Tetrix ceperoi* (BOLIVAR, 1887). – In: DETZEL, P. (Hrsg.): Die Heuschrecken Baden-Württembergs., Stuttgart, S. 328-332.
- DETZEL, P., WANCURA, R. & MEINEKE, T. (1998): *Tetrix bipunctata* (LINNAEUS, 1758). – In: DETZEL, P. (Hrsg.): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Stuttgart, S. 345-350.
- PRETSCHER, P. unter Mitarbeit von T. MEINEKE [und vielen anderen] (1998): Rote Liste der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera). – Schriftenreihe f. Landschaftspflege u. Naturschutz 55: 87-111.
- MEINEKE, T. (2000): Wiederherstellung von Magerrasen auf einer Porphyrkuppe – Erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes auf dem Abatassinenberg im Saalkreis. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 37: 3-20.
- MEINEKE, T. (2002): Rezension: Wulf Gatter, Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Limicola 16: 186-188.





- MEINEKE, T. & KRÜGENER, A. (2005): Natur und Nutzung im FFH-Gebiet „Dörnberg, Immelburg und Helfenstein“ bei Zierenberg im Landkreis Kassel. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 9: 138-153.
- MEINEKE, T. & THIELE, A. (2006): Die Rotflügelige Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica*) im Jonastal bei Arnstadt – Bestandsentwicklung nach Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 43: 20-26.
- MEINEKE, T. (2012): Bergsingzikaden *Cicadetta cantilatrix* SUEUR & PUISSANT, 2007, *Cicadetta brevipennis* FIEBER, 1876 und *Cicadetta montana* s. str. (SCOPOLI, 1772) im mittleren Deutschland (Auchenorrhyncha, Cicadidae, Cicadettinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 133-142.
- MEINEKE, T. & MENGE, K. (2013): Die Weißfilzige Blattschneiderbiene *Megachile pilidens* (Hymenoptera, Megachilidae) nimmt regelmäßig Schweiß auf. – Entomologische Nachrichten und Berichte 57: 76-77.
- MEINEKE, T. [2013]: Fledermäuse über dem Brocken. – Nyctalus (N.F.) 17 (2012): 338-352.
- MEINEKE, T. & MENGE, K. (2014): Ein weiterer Fund des Papierfischchens *Ctenolepisma longicaudata* ESCHERICH, 1905 (Zygentoma, Lepismatidae) in Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte 58: 153-154.
- MEINEKE, T. (2014): Funde der Leguminosenweißlinge *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) und *L. juvernica* WILLIAMS, 1946 (= *reali* auct. partim, nec REISSINGER, 1989) aus dem mittleren Deutschland (Lepidoptera, Pieridae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 58: 320-322.
- MEINEKE, T. (2015): Einige ergänzende Funde zur Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen an der nordwestlichen Peripherie Thüringens. – Informationen zur floristischen Kartierung in Thüringen 34: 37-39.
- MEINEKE, T. & MENGE, K. (2015): Weitere Funde von *Melitaea britomartis* ASSMANN, 1847 am nordwestlichen Rand des Artareals (Lepidoptera, Nymphalidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 59: 33-42.
- MEINEKE, T. (2015): *Pieris mannii* (MAYER, 1851) und *Eilema caniola* (HÜBNER [1808]) im südlichen Niedersachsen (Lepidoptera, Pieridae, Noctuidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 59: 43-48.
- MEINEKE, T. (2015): Phänologie und Verhalten flugaktiver Großer Abendsegler *Nyctalus noctula* (SCHREBER, 1774) im südlichen Niedersachsen in den Jahren 2000 bis 2014. – Säugetierkundliche Informationen 9 (49): 403-428.
- MEINEKE, T. (2015): Lautakustisch dokumentierter Nachweis der Singzikade *Cicadetta montana* s. str. (SCOPOLI, 1772) in Thüringen (Hemiptera, Cicadidae, Cicadettinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 59: 136-138.
- MEINEKE, T. (2016): Ein weiterer Fund von *Atelura formicaria* VON HEYDEN, 1855 in Thüringen (Zygentoma, Nicoletiidae, Atelurinae) und Synopsis der Lebensweise und Verbreitung. – Entomologische Nachrichten und Berichte 60: 45-51.
- MEINEKE, T. & MENGE, K. (2016): *Pieris mannii* (MAYER, 1851) im Hochharz und in Thüringen (Lepidoptera, Pieridae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 60: 245-246.
- MEINEKE, T., FELDMANN, B., JUNG, M. & MARTEN, A. (2017): Käfer (Coleoptera) am Kot des Rothirschen im Hochharz – eine Stichprobenaufsammlung. – Entomologische Nachrichten und Berichte 61: 137-147.
- MEINEKE, T. (2018): Jahres- und tageszeitliche Phänologie rufaktiver Grauer Langohren *Plecotus austriacus* auct. an einem Wohnhaus im südlichen Niedersachsen. – Säugetierkundliche Informationen 11 (54): 11-83.





- MEINEKE, T. (2019): Funde nicht häufiger Coleoptera, Heteroptera und Hymenoptera (Aculeata) auf pleistozänen Sedimenten im Westen des Leipziger Landes (Sachsen-Anhalt). – Entomologische Nachrichten und Berichte 63: 107-108.
- MEINEKE, T. (2020): 17 Jahre Tagfalter-Erfassung in einem Hausgarten – Artenspektrum, Phänologie und Dynamik. – Artenschutzreport 42: 10-26.
- MEINEKE, T. (2020): *Aricia artaxerxes* (FABRICIUS, 1793) im südlichen Niedersachsen (Lepidoptera, Lycaenidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 64: 277-282.





Vorträge und Posterbeiträge (Auswahl)

- MEINEKE, T., T. & KÖHLER, G. (1994): Der Zwerggrashüpfer (*Stenobothrus crassipes* [Charp.]) am Kyffhäuser-Gebirge. 3. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie vom 04.-06. März 1994 in Jena.
- KOCH, M. & MEINEKE, T. (1996): Verbreitung und morphometrische Unterschiede der nominellen Taxa *Tetrix kraussi* (SAULCY, 1888) und *Tetrix bipunctata* (LINNAEUS, 1758) sensu stricto. 4. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie vom 09.-10. März 1996 in Marburg.
- MEINEKE, T. (2002): Dynamik der Präsenz von Heuschrecken in Zeit und Raum - Beobachtungen entlang eines Höhengradienten im zentralen Harz in den Jahren 1990 bis 2001. 7. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie vom 23.-24.03.2002 in Münster.
- MEINEKE, T. (2005): Einige floristisch-faunistische Merkmale der Bergwiesen um Hohegeiß und die Problematik ihrer Erhaltung. – Workshop „Erhaltung von Bergwiesen als FFH-Lebensraumtyp – Förderung durch optimale Bewirtschaftung und Agrarumweltprogramme“. 29.-30. Juni 2005. Norddeutsche Naturschutzakademie (NNA) in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).
- MEINEKE, T. (2008): Schutzwürdigkeit von Kalkmagerrasen am Beispiel des NSG / FFH-Gebietes "Dörnberg". Veranstaltung „Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten – Lebensraumtyp Magerrasen“ der Naturschutz-Akademie Hessen am 11.06.2008.
- MEINEKE, T. (2009): Alles bewegt sich fort und nichts bleibt – Fallbeispiele des Kommens und Gehens von Heuschrecken zwischen Schierke und Brocken. [Teil-Ergebnisse alljährlicher Erkundungen entlang eines Transektes zwischen 1990 und 2009]
- MEINEKE, T. (2014): Große Abendsegler – Flugkünstler in Gefahr. Verbreitete Sichtweisen zur Biologie des Großen Abendsegens – zwischen Wunschdenken und Realität. Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V.: Windkraftanlagen und Fledermäuse in Sachsen-Anhalt 21.-23. März 2014, Roßla & Kelbra/Sittendorf.
- MEINEKE, T. (2018): Zur Frage der Präsenz (flugaktiver) Grauer Langohren – Über eine Möglichkeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V.: Fledermauskundliche Tagung 23. - 25.11.2018, Schloss Mansfeld in Mansfeld





Langzeitdokumentationen zur Populationsdynamik und Phänologie (Monitoring) - Auswahl

- Macroheterocera und ausgewählte nachtaktive Insektengruppen (Coleoptera, Hymenoptera, Heteroptera, Brachycera partim) im südlichen Niedersachsen – seit 1975 mittels täglichem Lichtfang (fortlaufend – Teilergebnisse publiziert)
- Libellen im Bereich des Seeburger Sees – Dokumentation des Artenspektrums und der Bestandsdynamik seit 1989, fortlaufend (Manuskript in Vorbereitung)
- Heuschrecken entlang eines Höhengradienten Schierke-Brocken – jährliche Stichprobenerfassung seit 1990 fortlaufend (Teilergebnisse publiziert bzw. vorgetragen, z.B. 2009 Kolloquium NP Harz)
- Nachtaktive Insekten über dem Brocken – Migration und Dispersal dokumentiert mittels Lichtfang 1994-2011 (Manuskript in Vorbereitung - Teilergebnisse wiederholt im Rahmen von Vortragveranstaltungen des NP Harz referiert)
- Tagfalter in einem nach Bebauung neu angelegten Hausgarten – 2003-2018. Artenspektrum (40 Arten), Phänologie, Bestandsveränderung (Manuskript)
- Stechimmen (Aculeata) in einem Hausgarten 2009-2018. Artenspektrum (395 Arten), Populationsdynamik, Möglichkeiten und Grenzen der Etablierung (Manuskript in Vorbereitung).
- Abendsegler und andere Fledermäuse am Seeburger See im südlichen Niedersachsen – Dokumentation des Erscheinens vor Einbruch der Dunkelheit im Rahmen täglicher Erfassungen seit 2000 (Teilergebnisse publiziert – siehe Meineke 2015)
- Fledermäuse im Siedlungsbereich – Permanente Erfassung mittels Detektor seit 2006 (fortlaufend – Teilergebnisse publiziert – siehe Meineke 2018)
- Grasfrosch im Bereich des Seeburger Sees – Dokumentation der Bestandsveränderungen anhand jährliche Zählung der Laichballen seit
- Wasservögel des Seeburger Sees und Umgebung – Brut und Rastbestände der Anatidae, Podicipidae, Gaviidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Rallidae, Laridae und Sternidae seit 1970 mittels regelmäßiger, ab 2000 nahezu täglicher Kontrollen. – In Vorbereitung: Bestandsdynamik, Herkunft und Überwinterungsgebiete der am Seeburger See brütenden und rastenden Lachmöwen.

